

Bilan climatique mensuel

septembre 2026

1. Résumé climatique général, septembre 2026	1
2. Bilan climatique à Uccle, septembre 2026	4
Bilan des valeurs mensuelles depuis 1991	4
Records et classement depuis 1901	4
Evolution des valeurs journalières	5
Comparaison aux valeurs mensuelles depuis 1991	6
3. Bilan climatique en Belgique, septembre 2026	8
Répartition géographique des températures	8
Répartition géographique des précipitations	9
Répartition géographique de l'indice de sécheresse	9
Répartition géographique du rayonnement solaire	10
Répartition géographique de l'activité orageuse	10

1. Résumé climatique général, septembre 2026

Un mois chaud et sec

Encore un mois très chaud

À quelques jours près, les températures à Uccle sont restées tout au long du mois supérieures aux valeurs normales. La température moyenne mensuelle s'élève à 17,4°C (normale : 15,2°C), ce qui place ce mois en **cinquième position** dans le classement des mois les plus chauds de la période de référence actuelle. Le record reste établi à 18,8°C en 2023.

Il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tard dans l'année. Le 29 septembre, la température maximale à Uccle a encore atteint 28,3°C, soit la température maximale la plus élevée jamais enregistrée au cours de la troisième décennie de septembre (21-30 septembre). Le top 3 est complété par deux valeurs datant du 19^e siècle: 28,1°C et 27,9°C, enregistrées respectivement les 25 et 26 septembre 1895 (mesures effectuées depuis 1892).

À Uccle, les températures ont varié entre 9,0°C (le 22 septembre) et 29,2°C (le 15 septembre). Cette température minimale est la deuxième plus élevée pour la période de référence actuelle. Le record reste établi à 9,2°C, enregistré en 1999.

À Uccle, nous avons enregistré 20 jours de printemps [max>=20°C] (normale : 12,2 jours) et 3 jours d'été [max>=25°C] (normale : 2,3 jours). Ce nombre de jours de printemps se classe en cinquième position, à égalité avec 1999 et 2014 (période de référence actuelle). Le record reste établi à 27 jours en 2006.

Fait remarquable : c'est déjà le 20^{ème} mois consécutif où la température moyenne mensuelle est supérieure à la normale. Janvier 2025 a été le dernier mois où les températures ont été inférieures à la moyenne. Il s'agit de la plus longue série enregistrée pour la période de référence actuelle (précédent record : 10 mois).

Dans notre pays, la température minimale la plus basse a été enregistrée le 25 septembre à Saint-Vith, avec 1,4°C. La température maximale la plus élevée a été enregistrée le 7 septembre à Ben-Ahin (Huy) et à Marche-en-Famenne, avec 31,4°C.

Le 29 septembre à Koersel (Beringen), la température maximale avait encore atteint 30°C. C'est la première fois que la barre des 30°C a été franchie aussi tard pour un mois de septembre dans une des stations de notre réseau de mesure (mesures depuis 1954).

Peu de précipitations

Au cours du mois dernier, Uccle n'a enregistré que 18,4 mm de précipitations (normale : 65,3 mm). Ces précipitations se sont réparties sur 9 jours (normale : 14,1 jours). Il s'agit du cinquième plus faible total pour la période de référence actuelle. Le record reste établi à 9,2 mm en 2006.

À Uccle, le total journalier le plus élevé s'est élevé à 5,7 mm et a été enregistré le 13 septembre.

C'est également le 13 septembre que le réseau de mesures climatologiques de l'IRM a enregistré le plus grand total journalier. À Ophoven (Kinrooi), il est tombé ce jour-là 42,1 mm de précipitations. Ce n'est que dans cette région que les précipitations ont dépassé la moyenne au cours du mois dernier.

Les précipitations moyennes régionales dans notre pays ont été partout inférieures aux valeurs normales et ont varié entre environ 15% de la normale en Lorraine belge et environ 80% de la normale dans la région de la Campine (et donc plus de 100% aux alentours de Kinrooi).

Le mois dernier, nous n'avons enregistré que **3 jours d'orage** dans notre pays (normale : 7,5 jours). Il s'agit du **troisième plus faible chiffre** pour la **période de référence actuelle**. Le record reste à 2 jours, établi en 1997 et 2003.

Plus ensoleillé que la normale

À **Uccle**, nous n'avons enregistré le mois dernier qu'une seule journée avec un ciel serein et une seule journée avec un ciel entièrement couvert. Les autres jours, la durée d'ensoleillement se situait entre ces deux extrêmes. Le mois de **septembre a donc été plus ensoleillé que la moyenne : 157h 21 min** (normale : 154h 27 min).

Remarque : les valeurs normales pour les paramètres repris dans ce texte sont les moyennes pour la **période 1991-2020** (la période de référence de 30 ans pour le climat actuel). Sauf mention contraire, les records sont valables pour la période à partir de **1991**.

2. Bilan climatique à Uccle, septembre 2026

Bilan des valeurs mensuelles depuis 1991

	Unité	Valeur	Normale		Record +	Année	Record -	Année
Température moyenne	°C	17.4	15.2	+	18.8	2023	12.7	1996
Température maximale moyenne	°C	22	19.5	+	24	2023	16.3	2001
Température minimale moyenne	°C	12.9	11.3	+	14.1	2023	9.2	1996
Total des précipitations	mm	18.4	65.3	-	199.4	2001	9.2	2006
Nombre de jours de précipitations	d	9	14.1		23	2001	6	1997
Nombre de jours d'orage en Belgique	d	3	7.5	--	18	2024	2	2003
Vitesse moyenne du vent	m/s	3	3.1		3.7	2025	2.4	2014
Direction du vent dominante		SO						
Durée d'insolation	hh:mm	157:21	154:27		220:01	2003	65:23	2001
Rayonnement solaire global	kWh/m ²	100.2	92.7		109.5	2018	65.9	2001
Humidité relative	%	75	77		86	2024	63	2018
Tension de vapeur	hPa	14.6	13.1		16.8	2023	10.6	2018
Pression atmosphérique	hPa	1020	1016.5		1021.9	1997	1010.3	1998

Normales définies par rapport à la période 1991–2020 (référence pour le climat présent).

Classement établi par rapport à la période 1991–2026.

Valeurs records de 1991 à 2025.

Définition des niveaux de classement depuis 1991.

+++	---	Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++	--	Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+	-	Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Records et classement depuis 1901

	Unité	Valeur		Record +	Année	Record -	Année
Température moyenne	°C	17.4	+	18.8	2023	10.7	1912
Température maximale moyenne	°C	22	+	24	2023	14.4	1912
Température minimale moyenne	°C	12.9	+	14.1	2023	7.1	1931
Total des précipitations	mm	18.4		199.4	2001	4.7	1959
Nombre de jours de précipitations	d	9		27	1950	2	1959
Durée d'insolation	hh:mm	157:21		298:44	1959	65:23	2001

Classement établi par rapport à la période 1901–2026.

Valeurs records de 1901 à 2025.

Définition des niveaux de classement depuis 1901.

+++	---	Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1901
++	--	Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1901
+	-	Valeur parmi les 10 plus élevées/faibles depuis 1901

Evolution des valeurs journalières




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Comparaison aux valeurs mensuelles depuis 1991




Fig. 5




Fig. 6



Nombre de jours de précipitations par mois, Uccle

valeurs récentes, normales (1991–2020) et valeurs extrêmes (1991–2025)




Fig. 7



Durée d'insolation mensuelle, Uccle

valeurs récentes, normales (1991–2020) et valeurs extrêmes (1991–2025)




Fig. 8



Précipitations, températures et insolation à Uccle, septembre

données de 1991 à 2026

La taille des bulles est proportionnelle au rapport à la normale 1991–2020 de l'insolation








Fig. 9

3. Bilan climatique en Belgique, septembre 2026


Répartition géographique des températures



Répartition géographique des précipitations




Répartition géographique de l'indice de sécheresse




L'indice de précipitations normalisé (SPI) permet de caractériser une sécheresse sur base des observations de précipitations. Cet indice compare les précipitations cumulées sur une durée de 3 mois (SPI-3) d'une manière standardisée par rapport à une climatologie de référence (1991–2020). Les classes "sec/humide", "très sec/humide" et "extrêmement sec/humide" correspondent respectivement à des périodes de retour de 10 à 30 ans, de 30 à 50 ans et de plus de 50 ans.

Répartition géographique du rayonnement solaire



Répartition géographique de l'activité orageuse



Ces 2 figures se basent sur les données collectées par le système de télédétection de la foudre de l'IRM. Celui-ci observe en temps réel l'activité électrique totale au-dessus de la Belgique. Il est constitué d'un réseau de senseurs qui captent le rayonnement électromagnétique produit par les éclairs. La combinaison des données de chaque senseur permet de localiser et de caractériser les coups de foudre au sol ainsi que les décharges dans les nuages. Les statistiques représentées ci-dessus incluent ces 2 types de décharges.

Cartes provisoires réalisées de manière automatique avec les données disponibles le 1^{er} octobre 2026.
Pour recevoir les cartes en haute résolution, merci de nous contacter via info@meteo.be.

Disclaimer

Tous les droits de propriété intellectuelle ayant trait aux données reprises dans les tableaux, textes et graphiques, sont la propriété exclusive de l'IRM. La mise à disposition publique sur le site internet de l'IRM ne donne pas lieu ou n'a pas pour conséquence un quelconque transfert ou cession de ces droits. En cas de publication contenant ces données, l'Utilisateur s'engage à mentionner

l'IRM comme source. L'Utilisateur s'engage à ne pas produire ou distribuer de services météorologiques à valeur ajoutée basés sur les données contenues dans les tableaux, textes et graphiques. L'IRM décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l'utilisation des données par l'Utilisateur. En cas de litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions particulières, les parties s'engagent à rechercher de bonne foi une solution amiable. A défaut, les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM), 2026